

4.5.2.4 Proline 480 SC (prothioconazole 480 g/L)

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

L'étiquette du pesticide est la seule source d'information ayant force de loi et elle contient toute l'information liée à l'utilisation du produit commercial. Le présent document est un résumé de l'étiquette. Lorsqu'il est question de répression, l'efficacité approximative du produit est de 60-75 % tandis qu'une suppression est de 85 % et plus. Il est important de toujours se référer à l'étiquette légale qui est disponible soit sur le contenant du pesticide ou soit sur le site internet de l'ARLA : <http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/lr-re/index-fra.php>. Veuillez vous assurer que vous avez la plus récente mise à jour de ce résumé d'étiquette.

Toujours aviser votre acheteur pour les applications des pesticides dans votre culture.

Fait avec l'étiquette du 10-06-2021

RÉSUMÉ DE L'ÉTIQUETTE

- Groupe 3
- Indice de risque pour la santé (IRS)¹ : 47
- Indice de risque pour l'environnement (IRE)² : 3
- Maladies à traiter :
 - Répression de la **tache septorienne**, de la **rouille** et de la **tache valdensienne**;
 - **Pourriture sclérotique**.
- Moment d'application :
 - **Tache septorienne, rouille et tache valdensienne** :
 - ✓ Appliquer dès les premiers signes de la maladie (**en végétation ou en récolte**);
 - ✓ Une application additionnelle peut être faite 10 à 14 jours plus tard si les conditions restent favorables au développement de la maladie.
 - **Pourriture sclérotique** :
 - ✓ Débuter les applications au début de la floraison et faire une 2^e application 5 à 10 jours plus tard.

¹ La valeur de l'IRS varie de 1 à 2 420. Plus le chiffre est élevé, plus le risque qu'il représente au niveau de la santé est important.

² La valeur de l'IRE varie de 1 à 961. Plus le chiffre est élevé, plus le risque qu'il représente pour l'environnement est important.

4.5.2.4 Proline 480 SC (prothioconazole 480 g/L)

- Taux d'application et mélange :
 - Dose + Ag-surf ou Agral à **1,25 L par 1 000 L**:
 - ✓ Tache septorienne : **315 mL/ha**;
 - ✓ Rouille et tache valdensienne : **400 mL/ha**;
 - ✓ Pourriture sclérotique : **315 à 420 mL/ha**.
 - Taux d'application : **minimum 100 L d'eau/ha**.
- Renseignements sur le produit :
 - Fongicide systémique à large spectre.
- Restrictions :
 - **Application terrestre** seulement;
 - Maximum de **2** applications par année;
 - Un maximum de 840 mL/ha peut être appliqué par culture, par année;
 - **Maintenir l'agitation** durant le mélange et la pulvérisation;
 - Le fongicide doit être **bien dispersé** avant l'ajout d'Ag-surf ou d'Agral;
 - Si la solution de pulvérisation demeure dans le réservoir jusqu'au lendemain ou pendant de longues périodes de temps au cours de la journée, **bien agiter avant d'appliquer**;
 - Ne pas appliquer lorsque de **fortes pluies** sont prévues;
 - Délai de réentrée : **24 heures**;
 - Délai avant la récolte : **7 jours**;
 - Zones tampons : 1 m des fossés, 3 m des cours d'eau, 30 m des puits.
- Entreposage :
 - Entreposer à l'écart de la nourriture de consommation humaine et animale, des semences, des engrais, des plantes;
 - Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil;
 - Ne pas entreposer à des températures inférieures au **point de congélation**;
 - Si le produit est entreposé depuis au moins 1 an, bien secouer avant d'utiliser;
 - Garder éloigné du feu, d'une flamme nue ou de toutes autres sources de chaleur;
 - Ne pas utiliser ni entreposer dans la maison ni à proximité de celle-ci;
 - Entreposer dans le contenant d'origine.
- Équipements de protection :
 - Chemise à manches longues et pantalon long;
 - Bottes et gants résistants aux produits chimiques;
 - Lunettes de protection ou écran facial durant le mélange;
 - Chapeau (nécessaire si l'application se fait vers le haut).

RÉDACTION 2016

Marie-Ève Moreau, agronome, responsable du volet agroenvironnement, Club Conseil Bleuet, Dolbeau-Mistassini

MISE À JOUR 2021

Laurence Bouchard, agronome, Club Conseil Bleuet, Dolbeau-Mistassini

FINANCÉE PAR

